

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
PROSPECT PENTRU PACIENT

AIRTAL
Comprimate filmate, 100 mg

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 14157 din 25.05.2009**

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament. Păstrați acest prospect. Poate vă fi nevoie să-l recitiți.
Dacă doriți mai multe informații, vă rugăm să întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
Acest medicament v-a fost prescris dumneavoastră personal. Nu-l dați altor persoane deoarece le poate face rău chiar dacă au simptome asemănătoare cu ale dumneavoastră.

In acest prospect găsiți:

1. Ce este *Airtal* și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați *Airtal*
3. Cum se utilizează *Airtal*
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează *Airtal*

***Airtal*, comprimate filmate**

Substanța activă este aceclofenac.

Excipienți:

Nucleu: palmitostearat de glicerol, croscarmeloza sodică, povidonă, celuloză microcristalină PH 101, celuloză microcristalină PH 102.

Film: sepifilm 752 White (conține: hipromeloza (35-45%), celuloză microcristalină (27-37%)).

1. CE ESTE *AIRTAL* SI PENTRU CE SE UTILIZEAZA?

Un comprimat filmat *Airtal*, conține aceclofenac 100 mg.

Airtal se prezintă sub formă de comprimate filmate.

Ambalaj: Cutie cu 2 blistere din PA-AI-PVC/AI a câte 10 comprimate filmate

Cutie cu 6 blistere din PA-AI-PVC/AI a câte 10 comprimate filmate

Grupa farmacoterapeutică: Derivați ai acidului acetic și substanțe înrudite

Indicații terapeutice:

Airtal este un medicament cu acțiune analgezică și anti-inflamatorie.

Este recomandat în tratamentul afecțiunilor acute sau cronice ale articulațiilor / aparatului locomotor.

2. ÎNAINTE SA UTILIZATI *AIRTAL*

Nu utilizați *Airtal*

Airtal nu trebuie administrat dacă:

- sunteți alergic la substanța activă, la alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) (de exemplu diclofenac) sau la oricare dintre excipienți.
- ați suferit de astm bronșic, erupții cutanale sau rinită acută, ca urmare a ingestiei de acid acetilsalicilic.
- Ați suferit de ulcer gastric sau duodenal recidivant sau aveți ulcer gastro-duodenal activ.
- aveți hemoragie digestivă sau de altă natură.
- în cazul în care sunteți însărcinată sau alăptați.
- dacă pacientul este un copil.
- suferiți de afecțiuni severe ale inimii, rinichilor sau ficatului (insuficiență cardiacă, renală sau hepatică severă).

Aveti grija deosebita cu *Airtal*

Ce trebuie sa-i spuneti medicului dvs. inainte de a va fi recomandat Airtal comprimate filmate?

Informati medicul dumneavoastra daca suferiti de orice alta afectiune – in special afectiunii renale si hepatice, afectiuni cardiace sau ale aparatului circulator, tulburari de coagulare, probleme de urinare sau daca ati suferit in trecut de ulcer gastric sau duodenal.

Puteti sa utilizati *Airtal* impreuna cu alte medicamente?

Trebuie sa-l informati pe medicul dumneavoastra daca luati orice alt medicament – inclusiv medicamente fara prescriptie medicala. Unele dintre aceste medicamente (de exemplu medicamentele care impiedica coagularea sangelui, numite anticoagulante, digoxina, fenitoina) pot sa influenteze efectul *Airtal*. De aceea, puteti sa va administrati *Airtal*, concomitent cu alte medicamente, numai cu acordul medicului.

Sarcina si alaptarea

Tratamentul cu *Airtal* comprimate filmate este contraindicat pe perioada sarcinii si in timpul alaptarii.

Puteti sa conduceti vehicule sau sa folositi utilaje in timp ce utilizati *Airtal*?

Medicul dumneavoastra va stabili in ce masura aveti restrictii pentru conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor, avand in vedere gravitatea reactiilor adverse pe care le-ati prezentat. Este necesar sa va consultati intotdeauna cu medicul dumneavoastra asupra acestor probleme, deoarece puteti sa va asumati efectuarea acestor activitati numai daca aveti acordul sau.

3. CUM SE UTILIZEAZA AIRTAL

Acest medicament trebuie administrat in dozele si perioada de timp recomandate de medicul dumneavoastra.

In cazul cand nu a fost prescris altfel de catre medic, doza maxima recomandata este de 100 mg aceclofenac (1 comprimat filmat *Airtal*) de doua ori pe zi (un comprimat filmat dimineata si un comprimat filmat seara).

Este foarte important sa urmariti recomandarea medicului, daca suferiti de afectiuni renale sau hepatice sau daca sinteti o persoana virstnica.

Daca ati utilizat mai multe comprimate filmate *Airtal* decit ar trebui

Adresati-va medicului dumneavoastra sau sectiei de urgente de la cel mai apropiat spital, deoarece consecintele supradozajului accidental sau deliberat pot impune interventia medicului.

4. REACTII ADVERSE POSIBILE

Ca orice alt medicament, *Airtal* poate sa aiba si reactii adverse. Astfel, in timpul tratamentului, pot sa apara: cefalee, slabiciune, ameteli, tulburari de somn, eruptii cutanale alergice, scaderea apetitului. Greata, varsaturi, dureri de stomac, arsuri gastrice, diaree sau constipatie si inflamarea mucoasei bucale. Alte reactii adverse, mai rare, includ palpitatii (batai ale inimii accelerate sau neregulate), edem (acumulare de lichid in tesuturile moi), dureri la nivelul membrelor inferioare si tremor.

Daca observati aparitia oricarei reactii adverse, trebuie sa informati medicul dumneavoastra. In cazul aparitiei scaunului negru, trebuie sa intrerupeti administrarea de *Airtal* comprimate filmate si sa solicitati imediat asistenta medicala.

5. CUM SE PASTREAZA AIRTAL

A nu se utiliza dupa data de expirare inscrisa pe ambalaj.

A se pastra la temperaturi de la +15 °C pina la + 25 °C., in ambalajul original.

A nu se lasa la indemina copiilor.

Producatorul:

Gedeon Richter Plc., Budapesta, Ungaria

Detinator Autorizatiei de punere pe piata:
Gedeon Richter Plc.,
Gyomroi ut. 19-21, 1103 Budapesta X., Ungaria