

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

AUROBIN unguent
AUROBIN

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 13331 din 11.09.2008**

ATC cod: C05A A04

COMPOZIȚIE

1 tub (20 g) conține 0,04 capronat de prednisolonă, 0,4 g clorhidrat de lidocaină, 0,4 g d-pantenol și 0,02 g tricloran în unguentul spălat cu apă.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

AUROBIN prezintă un preparat combinat conținând substanțe în proporții optime, eficiente în tratamentul proceselor inflamatorii ale regiunii perianale. Capronatul de prednisolonă este un glucocorticoid nehalogenat cu acțiune topică pronunțată. Micșorează permeabilitatea vaselor,

reduce simptomele inflamației.

Lidocaina în timp scurt înlătură durerea și senzația de usturime.

D-pantenolul favorizează regenerarea epitelului lezat.

Triclozanul este un antiseptic cu spectru larg de acțiune.

INDICAȚII

Procesele asociate cu inflamația regiunii anogenitale: pruritul anal, eczema, dermatita regiunii perianale, nodulii hemoroidali, fistula anală.

CONTRAINDICAȚII

Infecția virală, hipersensibilitatea la oricare component al preparatului. Terapia combinată, sistemică cu lidocaină în caz de altă afecțiune.

UTILIZARE TERAPEUTICĂ

Unguentul în strat subțire se aplică pe suprafața lezată de 2-4 ori pe zi.

În cazul nodulilor hemoroidali interni o cantitate mică de unguent (de mărimea unui bob de mazăre) se introduce în rect de 2-4 ori în 24 ore.

După atenuarea simptomelor acute se va administra mai rar.

EFECTE ADVERSE

În tratamentul de durată pot apărea atrofia pielii, cicatrizarea, hipertricoza. În tratamentul nodulului hemoroidal intern supradozajul se poate solda cu bradicardie moderată.

PRECAUȚII

În aplicarea preparatului pe suprafețe extinse se va lua în calcul posibilitatea absorbției substanțelor active și nu se va permite administrarea în primul trimestru al sarcinii, în continuare se va cere precauție deosebită.

Din cauza conținutului de steroizi se vor evita curele de tratament neîntrerupte și de durată. Dacă inflamația persistă datorită prezenței de fungi, trebuie inițiată o terapie combinată specifică.

PREZENTARE

1 tub (20 g).

**GEDEON RICHTER
BUDAPESTA-UNGARIA**