

## INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

### **CALUMID** comprimate filmate, 50 mg

**Numărul certificatului de înregistrare  
în Republica Moldova: № 12538 din 29.01.2008**

#### PROSPECT PENTRU PACIENT

***Citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe administrarea preparatului!  
Păstrați acest prospect, deoarece poate apărea necesitatea de a-l reciti.  
Dacă apar întrebări suplimentare, consultați medicul curant sau farmacistul.  
Acest preparat a fost prescris de medic pentru Dumneavoastră. Nu propuneți  
preparatul altor persoane, chiar dacă simptomele bolii sunt similare cu ale  
Dumneavoastră, deoarece aceasta poate dăuna sănătății lor.***

#### **Sumarul prospectului:**

1. În ce afecțiuni este indicat acest preparat și cum el acționează?
2. Ce trebuie de știut înainte de a începe tratamentul cu acest preparat?
3. Cum se va administra preparatul Calumid?
4. Ce reacții adverse pot apărea la administrarea preparatului Calumid?
5. Cum trebuie de păstrat comprimatele Calumid?

#### **1. În ce afecțiuni este indicat acest preparat și cum el acționează?**

Calumid este un preparat antitumoral nesteroidian care blochează acțiunea hormonilor androgeni și ca rezultat are loc involuția tumorii prostatei. Preparatul este indicat în paralel cu tratamentul chirurgical sau cu alte preparate medicamentoase.

**Substanță activă :** un comprimat filmat conține 50 mg bicalutamid.

#### **Substanțe auxiliare:**

**Nucleul** –dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu, povidon, amidon carboximetilat de sodiu (tip A), lactoză monohidrat.

**Filmul** – oladrai II. 33G 28523 alb (gliceril triacetat, macrogol 3350, lactoză monohidrat, dioxid de titan C.I. 77891, E 171, hipromeloză).

#### **Informație importantă despre componența preparatului :**

În caz de intoleranță la lactoză trebuie de luat în considerație că fiecare comprimat Calumid conține 64 mg lactoză.

#### **2. Ce trebuie de știut înainte de a începe tratamentul cu acest preparat?**

##### **Comprimatele Calumid sînt contraindicate:**

- în caz de hipersensibilitate (alergie ) la componentele preparatului
- copiilor
- persoanelor de sex feminin.

##### **Administrarea concomitent cu alte preparate medicamentoase:**

La administrarea preparatului Calumid pot apare dereglări hepatice, de aceea este necesar să informați medicul curant despre prezența afecțiunilor hepatice la moment sau suportate anterior.

Preparatul Calumid poate modifica acțiunea altor preparate medicamentoase administrate concomitent. Este necesar să anunțați medical curant dacă la moment luați și alte preparate medicamentoase sau ați luat un tratament în timpul apropiat (fie preparate cu prescripția medicului sau fără prescripție). Aceasta este foarte important în caz că luați (ați luat) preparate antialergice, anticoagulante, cardiace, antimicotice, precum și preparate ce scad tensiunea arterială și care suprimă sistemul imun.

### **Cum influențează preparatul Calumid capacitatea de a conduce mașini și/sau de a manevra utilaje tehnice?**

Nu sînt date despre influența negativă a preparatului Calumid asupra capacității de a conduce mașini și/sau de a manevra utilaje tehnice. Preparatul poate provoca vertij și somnolență, de aceea este necesar de a evita activitățile cu risc crescut de traumatism.

### **3. Cum se va administra preparatul Calumid?**

Preparatul poate fi administrat numai cu prescripția medicului, în doza și timpul indicat de medic.

Doza nictemerală este de un comprimat Calumid (50 mg) o dată pe zi. Este preferabil ca comprimatele să fie luate la una și aceeași oră, fără a fi rugumate cu apă din abundență.

Dacă ați omis o administrare nu suplimentați doza preparatului la următoarea administrare, deoarece astfel nu veți ajusta doza omisă, dar apare riscul supradozării preparatului.

### **Dacă ați administrat o doză mai mare ca cea prescrisă:**

Dacă ați administrat o doză mai mare decît cea prescrisă adresați-Vă de urgență la medic!

### **4. Ce reacții adverse pot apărea la administrarea preparatului Calumid?**

De obicei preparatul este bine suportat de pacienți. Dar ca și în cazul altor preparate la administrarea comprimatelor Calumid pot apărea reacții adverse.

Uneori pot apare "crize" de hiperemie la nivelul feței, sensibilitate crescută și mărirea glandelor mamare, greață, vomă, diaree, prurit, uscăciune a pielii, colorație icterică a pielii și sclerelor, somnolență, insomnie, dureri în piept, palpitații.

Ca și în cazul altor preparate pot apare reacții alergice.

În caz de apariție a efectelor adverse sus-numite sau altor manifestări neobișnuite, e necesar de consultat medicul curant privitor la administrarea ulterioară a preparatului.

### **5. Cum trebuie de păstrat comprimatele Calumid?**

A se păstra la temperatura între 15- 30°C.

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

A se păstra la loc inaccesibil pentru copii!