

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

INSTRUCȚIUNI PENTRU ADMINISTRARE

CAVINTON FORTE comprimate
Cavinton forte

**Numărul certificatului de înregistrare în R. Moldova:
Nr. 10574 din 21.07.2006**

Vă rugăm citiți atent fișa informațională înainte de utilizarea preparatului.

Preparatul se va utiliza pe bază de prescripție medicală.

Ce prezintă preparatul Cavinton sau Cavinton forte și pentru ce se utilizează?

CAVINTON se utilizează în tratamentul afecțiunilor survenite în urma insuficienței cerebro-vasculare, asociate cu dereglările neurologice și psihice. CAVINTON se folosește de asemenea pentru corecția dereglărilor de ordin oftalmologic și otologic, provocate de afecțiunile vasculare.

Fiecare comprimat de CAVINTON conține 5 mg vinpocetină.

Fiecare comprimat de CAVINTON FORTE conține 10 mg vinpocetină.

Substanțe auxiliare: lactoza, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu, talc, amidon de porumb.

Când este contraindicată administrarea de CAVINTON sau CAVINTON FORTE?

Nu va fi administrat în caz de sarcină, lactație, hipersensibilitate cunoscută la ingredientul activ sau alte componente ale comprimatului.

În caz de intoleranță la lactoză se va lua în calcul că fiecare comprimat de CAVINTON a câte 5 mg conține 140 mg lactoză și fiecare comprimat de CAVINTON FORTE (10 mg) conține 83 mg lactoză.

Medicul curant trebuie să fie informat de existența bolilor asociate (în special dereglările de ritm cardiac și devierile detectate în ECG).

Cum trebuie administrat CAVINTON sau CAVINTON FORTE?

Doza și durata curei de tratament se individualizează conform prescripției medicului.

Dacă medicul nu prescrie altfel, doza zilnică uzuală constituie 1-2 comprimate CAVINTON de 3 ori pe zi sau 1 comprimat de CAVINTON FORTE 3 ori pe zi.

Deoarece preparatul nu manifestă acțiune hepato- și nefrotoxică, ajustarea dozelor la pacienții cu afecțiuni renale și hepatice nu este necesară.

Preparatul trebuie administrat după mese.

Ce efecte nedorite pot apărea în cursul administrării de Cavinton și ce trebuie făcut dacă ele apar?

La administrarea de CAVINTON efectele adverse s-au semnalat în cazuri rare (la 2,6 % pacienți). Pot apărea congestie a feței, simptome alergice cutanate, greață, pirozis, xerostomie, dereglări de ritm cardiac (tahicardie sau aritmii), insomnie, vertijă, cefalee, astenie.

Medicul curant trebuie să fie informat de apariția acestor simptome.

Cum trebuie păstrat CAVINTON sau CAVINTON FORTE?

Se va păstra la temperaturi între 15-30°C, ferit de lumină.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Preparatul va fi utilizat numai până la data de expirare indicată pe ambalaj.

La apariția altor întrebări se va solicita un consult medical sau farmaceutic.

RGD:49019/H/2

RG: 4994, RGD: 49945/R/2,

29028130

GEDEON RICHTER
BUDAPESTA-UNGARIA