

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

## INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

**CURIOSIN** soluție  
CURIOSIN

**Numărul certificatului de înregistrare  
în Republica Moldova: nr. 11259 din 09.02.2007**

***Vă rugăm citiți atent prospectul înainte de utilizarea preparatului.***

### ***Ce trebuie să știți despre soluția Curiosin?***

1 flacon (10 ml) de Curiosin soluție conține 20,5 mg hialuronat de zinc în calitate de ingredient activ.

Preparatul se utilizează ca adjuvant în terapia rănilor trenante infectate, dicubitusurilor, fistulelor, de asemenea pentru a urgenta cicatrizarea rănilor.

### **Numai pentru uz extern!**

Se eliberează numai în farmacie pe bază de prescripție medicală.

### ***Când este contraindicată administrarea de Curiosin soluție?***

Nu poate fi administrat în caz de hipersensibilitate la preparat.

### ***Cum trebuie administrat Curiosin soluție?***

Dacă medicul nu prescrie altfel, soluția se picură pe regiunea lezată a corpului în volum care asigură umezirea uniformă a suprafeței sau se picură pe pansament de tifon de dimensiuni corespunzătoare și se aplică pe rană.

Pansamentul se schimbă 1-2 ori pe zi.

Doza și durata curei de tratament se vor determina de către medic.

### ***Ce se va lua în considerație pe parcursul administrării de Curiosin soluție?***

Înainte de utilizarea preparatului suprafața rănilor se va spăla cu soluție de peroxid de hidrogen 3%

sau cu soluție fiziologică.

### ***Ce efecte nedorite pot apărea în cursul utilizării de Curiosin soluție și ce trebuie făcut dacă ele apar?***

În debutul tratamentului rar poate apărea o ușoară senzație de usturime care dispare treptat pe parcursul curei de tratament.

În cazul apariției unui simptom neașteptat care nu s-a semnalat anterior în timpul utilizării preparatului, imediat se va anunța medicul curant.

### ***Cum trebuie conservat Curiosin soluție?***

După deschiderea flaconului preparatul poate fi utilizat timp de 4 ore în condițiile de conservare la temperaturi între 15-30°C.

Preparatul va fi utilizat numai până la data de expirare indicată pe ambalaj.

### **A nu se lăsa la îndemăna copiilor!**

La necesitate, pentru a obține informație suplimentară, se va solicita un consult medical sau farmaceutic.

Prezentare: 10 ml

Data ultimei revizuirii a textului: 20 martie 1996.

RGD:46294/H/3

RG:2060, RGD:48344/R/3,

29003490

**GEDEON RICHTER  
BUDAPESTA - UNGARIA**

