

## INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

ATC cod: D10A X19

**CURIOSIN** gel

### **Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: nr. 12476 din 25.12.2007**

Ingredientul activ din compoziția preparatului, hialuronatul de zinc, se utilizează în tratamentul de acnee, datorită proprietăților farmacologice.

De rînd cu doi factori importanți din patomecanismul de acnee (hiperplazia glandei sebacee și hipercheratinizarea canalului excretor al foliculului) importanță deosebită au substanțele biologic active, formate și eliminate sub acțiunea de *Propionibacterium acnes*. În urma schimbărilor patologice nominalizate se dereglează echilibrul și scade concentrația acidului hialuronic în țesuturi. Compensarea necesității crescute de acid hialuronic în țesuturi devine posibilă prin aplicarea topică de Curiosin gel.

Acidul hialuronic este un polimer mucopolizaharidic și un element important de construcție a substanței intercelulare. Datorită hiperhidrofilității acidul formează matrice de dispersie cu moleculele de apă, participă la menținerea elasticității și tonusului tegumentelor.

Are efect antiinflamator.

Asocierea acidului hialuronic cu zinc este argumentată, deoarece zincul inhibă activitatea lipazelor de *Propionibacterium acnes*, întrerupe procesul patologic, care menține afecțiunea și restabilește metabolismul epidermal dereglat. Manifestă efect antibacterian.

Curiosin gel posedă acțiune în cazurile de formare de comedoane și de elemente inflamatorii. În cursul tratamentului se resorb pustulele și papulele, scade eritemul și fenomenele papuloase.

### **INGREDIENTUL ACTIV**

15, 40 mg de hialuronat de zinc în 15 g gel.

Substanțe auxiliare: sorbat de potasiu, hidroxid de sodiu, carbomer.

### **INDICAȚII**

Toate tipurile de acnee de gravitate ușoară, secundară și severă, de preferință, în tratamentul topic de comedoane și acnee papulo- pustuloasă.

### **CONTRAINDICAȚII**

Hipersensibilitatea la oricare din componentele preparatului.

### **UTILIZARE TERAPEUTICĂ**

După curățirea minuțioasă a regiunilor afectate ale pielii se aplică în strat subțire de 2 ori pe zi.

Gelul se absoarbe în piele în câteva minute, ceea ce exclude utilizarea de pansament ocluziv.

### **EFECTE ADVERSE**

În debitul tratamentului poate surveni o ușoară senzație de usturime și eritem. Dacă pielea este uscată, poate apărea senzație de extensie, dilatare.

### **INTERACȚIUNI**

Nu au fost semnalate.

### **PRECAUȚII**

Preparatul nu conduce la fotosensibilizare, nu colorează pielea și lenjeria.

**CONDIȚII DE PASTRARE** : La temperaturi între 15-30° C.

**PREZENTARE**

Tuburi a câte 15 g

RG 5855, RGD: 49946/R/1, RGD: 49011/H/1  
29039680

**GEDEON RICHTER**  
**BUDAPESTA-UNGARIA**