

INSTRUCȚIUNI PENTRU ADMINISTRARE

ESCAPELLE Comprimate

ESCAPELLE

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 8760 din 21.02.2005**

ESCAPELLE comprimate ESCAPELLE

Înainte de administra acest preparat, Vă rugăm să citiți cu atenție această foaie informativă.
Păstrați această foaie informativă, deoarece pe viitor ați putea avea nevoie de informația descrisă în ea.

În caz că apar întrebări, adresați-le medicului sau farmacistului Dvs.

Medicul a prescris acest preparat special pentru Dvs, deci nu-l dați nimănui altuia, deoarece pentru altcineva ar putea fi dăunător.

Conținutul foi informative:

1. Din ce tip de preparate fac parte comprimatele Escapelle și când se utilizează ele?
2. Ce trebuie să știm înainte de a începe tratamentul cu comprimate Escapelle?
3. Cum trebuie administrate comprimatele Escapelle?
4. Efecte secundare posibile?
5. Condiții de păstrare.

Substanța activă: 1,50 mg levonorgestrel într-un comprimat.

Substanțe auxiliare: amidon de cartof, amidon de porumb, siliciu anhidru coloid, stearat de magneziu, talc, monohidratat lactoză (142,5 mg).

Aspect exterior: comprimate plate de culoare albă sau aproape albă cu fațetă și gravura „GOO” pe o parte.

Ambalaj: Un comprimat în blister. Un blister în ambalaj.

Producător și responsabil pentru scoaterea în circulație:
Gedeon Richter , Budapesta, Ungaria

1. DIN CE TIP DE PREPARATE FAC PARTE COMPRIMATELE ESCAPELLE ȘI CÂND SE UTILIZEAZĂ ELE?

Comprimatele Escapelle conțin levonorgestrel, hormon luteal sintetic.

Comprimatele Escapelle sunt un remediu contraceptiv creat pentru situații de urgență. Escapelle este indicat pentru administrarea în primele 72 ore după actul sexual, în timpul căruia fie că nici un remediu contraceptiv nu s-a utilizat, fie că utilizarea lui a fost greșită sau nu prea sigură.

Comprimatul Escapelle poate fi utilizat în orice zi a ciclului menstrual.

Preparatul previne gravitatea în 84% cazuri dacă preparatul este administrat în primele 72 ore după actul sexual. În caz că nu țineți minte cu precizie timpul actului sexual, sau în perioada aceluiași ciclu menstrual, cu 72 ore mai înainte a avut loc un alt act sexual fără utilizarea vreunui remediu contraceptiv, atunci concepția a avut loc, probabil, și administrarea comprimatului Escapelle după al doilea act sexual este inutilă.

Eficacitatea preparatului Escapelle este mai joasă decât a remediilor hormonale utilizate în mod regulat. În cazul când necesitatea de a utiliza preparatul Escapelle apare

mai frecvent, înseamnă că Dvs. trebuie să folosiți altă metodă contraceptivă, creată pentru utilizarea îndelungată.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIM ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ADMINISTRAREA COMPRIMATELOR ESCAPELLE?

Preparatul nu trebuie utilizat în următoarele cazuri:

- hipersensibilitatea la unul din componentele lui;
- orice boală hepatică gravă;
- în timpul sarcinii.

În cazurile ce urmează Escapelle poate fi administrat, însă, cu mare precauție:

Dacă în timpul administrării preparatului ați rămas însărcinată, adresați-vă numaidecât medicului.

Cu toate că nu există dovezi despre acțiunea nocivă a preparatului asupra fătului, controlul medical este necesar pentru excluderea sarcinii extrauterine. Controlul medical e deosebit de important în cazul apariției unor dureri abdominale puternice, sarcină extrauterină, inflamația organelor bazinului mic sau operațiile pe ele au avut deja loc în trecut. În afecțiunea hepatică gravă administrarea comprimatele poate fi contraindicată. În afecțiunile grave ale absorbției, de exemplu în boala Crohn, eficacitatea preparatului scade. Administrarea repetată a preparatului în timpul unuia și aceluiași ciclu menstrual nu se recomandă, deoarece poate deregla ciclul. După administrarea preparatului adresați-Vă medicului Dvs. pentru ca el să Vă aleagă alt medicament anticoncepțional pentru a fi folosit mai departe.

Utilizarea altor remedii medicamentoase

Unele remedii medicamentoase (antiepilepticele, antifungicele, antibioticele) pot grăbi inactivarea substanței active a preparatului Escapelle și în administrarea lor concomitentă îi pot reduce eficacitatea. Aceiași acțiune pot avea preparatele de pojar niță. Comunicați medicului sau farmacistului Dvs. ce preparate medicamentoase mai utilizați, achiziționate cu sau fără rețetă.

Sarcina

În timpul sarcinii comprimatele Escapelle sunt interzise. Preparatul nu întrerupe sarcina. Conform datelor numeroaselor observații clinice, preparatul nu manifestă acțiune nefastă asupra fătului conceput în timpul folosirii comprimatele Escapelle.

Lactația

Substanța activă a preparatului pătrunde în laptele matern. În perioada lactației luați comprimatul imediat după alăptarea copilului.

Influența preparatului asupra capacității de a conduce automobilul

Cercetări referitoare la influența preparatului asupra capacității de a conduce și de a lucra cu alte mecanisme nu s-au efectuat.

Informație importantă, avertismente

După administrarea preparatului menstruația, de regulă, are loc la timp și decurge fără perturbații. Însă în cazuri rare e posibilă o menstruație ceva mai timpurie sau mai întârziată (aproximativ cu ± 2 zile). În cazul reținerii menstruației pentru un termen de peste 5 zile sau în cazul modificării caracterului ei, sau în suspiciunea sarcinii (greață, vomă, tensiunea glandelor mamare ș.a.) adresați-Vă medicului Dvs.

Informație importantă despre compoziția preparatului

În cazul intoleranței la lactoză trebuie de avut în vedere că fiecare comprimat conține 142,5 mg lactoză.

3. CUM TREBUIE ADMINISTRATE COMPRIMATELE ESCAPELLE?

Comprimatul trebuie luat în primele 72 ore după actul sexual neprotejat. În caz că peste 3 ore după administrarea comprimatului intervine voma, trebuie luat al doilea comprimat.

După utilizarea unui comprimat al contracepției de urgență și până la următoarea menstruație trebuie folosite alte metode de contracepție, de exemplu, utilizarea prezervativului. După folosirea comprimatului Escapelle utilizarea vreunui preparat hormonal al contracepției planice nu este contraindicată.

Chestiunea referitoare la utilizarea preparatului Escapelle de către copii trebuie discutată minuțios.

Dacă Dv ați depășit doza prescrisă

Preparatul trebuie primit conform prescripției medicului în doza, în perioada și după metoda indicate de el.

În caz de supradozare sunt posibile greață, dereglări menstruale și în asemenea cazuri trebuie să Vă adresați imediat la medic.

4. EFECTE SECUNDARE POSIBILE

Ca și alte preparate medicamentoase, comprimatele Escapelle pot provoca efecte nedorite. În peste 10% din cazuri sunt posibile dereglări menstruale, greață, senzație de oboseală, dureri în partea inferioară a abdomenului, cefalee. Cu o frecvență de 1-10% apar amețeli, tensiune în glandele mamare, diaree, vomă.

5. CONDIȚII DE PĂSTRARE.

Se păstrează în ambalajul original la temperatura de 15-25 °C.

Preparatul poate fi utilizat înainte de expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Păstrați preparatul într-un loc inaccesibil pentru copii!

Gedeon Richter
Budapesta – Ungaria