

**Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE**

FTOROCORT unguent

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: Nr.12333 din 10.12.2007**

Denumirea internațională nepatentată. Triamcinolonum

Forma farmaceutică: unguent.

Substanța activă: triamcinolon acetonid.

Substanțe auxiliare: metilparahidroxibenzoat, acid stearinic, polisorbat 60, parafină lichidă, glicerină (85%), apă purificată.

Descrierea

Unguent omogen de culoare albă, fără miros.

Proprietăți farmacologice și codul ATC

Glucocorticoid D07A B09.

Farmacodinamica

Glucocorticoid pentru uz extern. Posedă acțiune antiinflamatoare, antialergică, antiexudativă și antipruriginoasă.

Farmacochinetica

Triamcinolon se absoarbe puțin la administrarea externă și nu posedă acțiune sistemică semnificativă.

Indicații terapeutice

Toate formele de eczeme cronice și acute, indiferent de localizare, prurit anogenital, neurodermită, dermatită de contact de diferite etiologii, pemfigus vulgar, dermatită herpiformă, eritem exudativ polimorf, lupus eritematos, lichen plan și lichen verucos, psoriazis.

Fotosensibilitate, arsură solară, urticarie solară, înțepături de insecte, psoriazis, granulom anular, dermatită exfoliativă a nou-născuților, eritrodermia descuamativă a sugarului, inflamația urechii externe, radiodermatită, pemfigus.

Se administrează strict la recomandarea medicului, pentru a evita complicațiile.

Contraindicații

Utilizarea în oftalmologie, infecție virotică, micoză, tuberculoza cutanată, afecțiuni sifilitice a dermei, varicelă.

Hipersensibilitate la preparat.

Doze și mod de administrare

Unguentul se aplică de 2-3 ori pe zi în strat subțire pe suprafața afectată (nu mai mult de 15 g unguent pe zi), ori se administrează în formă de pansament ocluziv (nu mai mult de 10 g unguent pe zi).

Interacțiunea cu alte medicamente

Date referitor la interacțiunea cu alte medicamente lipsesc.

Efecte adverse

Unguentul aplicat pe porțiuni mari ale pielii poate să se absoarbă și să dezvolte acțiune sistemică. Agenții patogeni, care provoacă supurație, pot penetra mai ușor prin stratul

lax cornos. Pot fi întâlnite și procese cauzate de blastomicete. Rar pot apărea hemoragii sub pansamentul ocluziv. În folosirea de lungă durată se poate dezvolta atrofia pielii.

Atenționări

Este periculoasă administrarea pe față în cure de lungă durată. Administrarea la copii poate fi efectuată doar în cazuri excepționale! Este interzisă folosirea preparatului în oftalmologie.

Supradozaj

Cazuri de supradozaj nu sunt cunoscute.

Prezentare

Unguent de triamcinolon acetonid 15 mg, câte 15 g în tuburi. Unguentul se spală ușor de pe suprafețe.

Condiții de păstrare

La temperatură de 8-15°C.

Preparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

Termen de valabilitate

2 ani.

Preparatul trebuie să fie folosit în conformitate cu termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.

Producător:

Gedeon Richter, Budapesta, Ungaria