

**Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**  
**Instrucțiune pentru administrare**

**NORMODIPIN® comprimate**

**№ certificatului de înregistrare în Republica Moldova:**

NORMODIPIN® comprimate 5 mg nr.9052 din 15.06.2005

NORMODIPIN® comprimate 10 mg nr.9053 din 15.06.2005

Normodipin® se prescrie pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, și de asemenea pentru tratamentul anginei pectorale.

Se administrează numai cu prescripție medicală.

Dozele și durata tratamentului se indică de medicul curant.

**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunea pentru administrare înainte de începerea tratamentului.**

**Ce reprezintă preparatul Normodipin® și în ce cazuri se administrează?**

Comprimatele conțin:

*substanța activă* -amlodipina 5 mg ori 10 mg.

*substanțe auxiliare*-magneziu stearat, carboximetilamilopectin-A de sodiu, calciu hidrofosfat, celuloză microcristalină.

Normodipin® este blocant al canalelor de calciu și se folosește pentru tratamentul hipertensiunii arteriale și tratamentul anginei pectorale.

**În ce cazuri preparatul Normodipin® este contraindicat?**

Normodipin® este contraindicat în caz de hipersensibilitate la substanța activă (almodipina) ori la oricare component din substanțele auxiliare. De asemenea, utilizarea Normodipin® nu se recomandă, dacă au fost reacții alergice în antecedente la administrarea preparatelor din grupa dihidropiridinelor (de exemplu, nifedipină, nicardipină, isradipină). Este necesar să informați medicul despre apariția reacțiilor alergice la aceste substanțe ori la altele.

**Cum trebuie să fie administrat preparatul Normodipin® ?**

Dozele și durata tratamentului se indică de medic. Doza nictemerală este 1 comprimat Normodipin® de 5 mg. Medicul curant poate mări această doză până la doza maximală unică nictemerală 10 mg (1 comprimat Normodipin® de 10 mg 1 dată în zi), deoarece efectul terapeutic al preparatului se menține timp de 24 ore.

În afecțiunile hepatice se recomandă monitorizarea pacientului.

Tratamentul trebuie să fie efectuat sub supravegherea medicului!

**Atenționări**

Este necesar de a informa medicul despre alte maladii (de exemplu, afecțiuni hepatice).

Este necesar de a informa medicul în caz de sarcină ori perioada de alăptare, deoarece medicul trebuie să decidă despre posibilitatea administrării preparatului, conform raportului beneficiu/risc.

Administarea concomitentă (ocazională ori de regulă) a Normodipin® cu alte medicamente poate provoca interacțiuni, din această cauză folosirea concomitentă cu alte medicamente este posibilă doar cu consimțământul medicului.

**Care sunt efectele nedorite ce pot apărea la administrarea Normodipin® și ce se recomandă în aceste cazuri?**

În timpul administrării preparatului pot fi întâlnite edeme ale gambelor, cefalee, rar – fatigabilitate, vertij, greață, hiperemia a feței.

În cazul apariției acestor simptome ori altor efecte adverse este necesar să Vă adresați imediat la medicul curant.

**Care sunt condițiile de păstrare a preparatului Normodipin®?**

Comprimatele se păstrează la temperatura 15-30°C.

Preparatul trebuie să fie folosit în conformitate cu termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.

**Preparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.**

Dacă aveți alte întrebări adresați-Vă medicului sau farmacistului.

**Producătorul**

**Gedeon Richter, Budapesta, Ungaria**