

PANANGIN
comprimate filmate

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 13490 din 09.10.2008**

Denumirea comercială

Panangin

DCI-ul substanțelor active

Magnesii asparaginas

Kalii asparaginas

COMPOZIȚIA PREPARATULUI

1 comprimat filmat conține:

substanțe active: asparaginat de magneziu anhidru 140 mg (sub formă de asparaginat de magneziu tetrahidrat 175 mg) și asparaginat de potasiu anhidru 158 mg (sub formă de asparaginat de potasiu semihidrat 166,3 mg);

substanțe auxiliare: siliciu coloidal anhidru, povidonă, amidon de cartofi, talc, stearat de magneziu, amidon de porumb, macrogol 6000, dioxid de titan, Eudragit E.

Descrierea preparatului

Comprimate filmate de culoare albă sau practic albă, sub formă de disc, biconvexe, ușor lucioase și cu suprafață nesemnificativ neregulată, fără miros.

Forma farmaceutică

Comprimate filmate.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ și codul ATC

Preparate din magneziu, combinații, A12C C55

PROPRIETĂȚILE FARMACOLOGICE

Magneziu (Mg^{++}) și potasiu (K^+) sunt cationi intracelulari importanți. Ei joacă un rol principal în activitatea unor șir de enzime, în legătura macromoleculilor cu structurile intracelulare și în mecanismul molecular de contracție a fibrei musculare. Raportul extra- și intracelular a ionilor de potasiu (K^+), calciu (Ca^{++}), sodiu (Na^{++}) și magneziu (Mg^{++}) influențează asupra contractilității musculaturii cardiace. Asparaginatul, ca substanță endogenă, este un transmitător bun de ioni, posedă o afinitate înalt față de celule, sărurile lui într-un grad mai mic disociază, astfel ionii sub formă de complexe trec în celule. Asparaginatul de magneziu și potasiu ameliorează metabolismul musculaturii cardiace.

Insuficiența de magneziu/potasiu contribuie la dezvoltarea hipertensiunii arteriale, modificărilor sclerotice a vaselor coronariene, aritmiilor, modificării musculaturii cardiace.

INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratament adjuvant al maladiilor cardiace cronice (insuficiență cardiacă, perioada postinfarct), aritmii – în special aritmii ventriculare.

Tratament adjuvant la glicozide cardiace.

Administrarea suplimentară de magneziu și potasiu.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se va administra câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi. Doza nictemerală poate fi crescută până la 3 comprimate de 3 ori pe zi. Sucul gastric reduce eficiența preparatului, de aceea se recomandă administrarea preparatului după mese.

REAȚII ADVERSE

La administrarea dozelor mari de preparat poate să se înregistreze scaun frecvent.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la componentele preparatului.
Insuficiență renală acută și cronică. Boala Addison. Bloc atrioventricular de gradul III.
Șoc de etiologie cardiacă (tensiunea sistolică sub 90 mmHg).

SUPRADOZAJ

Cazuri de supradozaj nu au fost înregistrate. În caz de supradozare pot să se dezvolte simptomele de hipermagneziemie și hiperkaliemie.

Se va întrerupe administrarea preparatului și se va institui terapie simptomatică (administrarea intravenoasă a clorurii de calciu, în doză de 100 mg/min, la necesitate se va efectua hemodializa).

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Preparatul se va administra cu precauție la bolnavii cu maladii, care sunt însoțite de hiperkaliemie și se va controla sistematic nivelul plasmatic al ionilor.

INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE

Tetraciclinele orale, sărurile de fier și fluorura de sodiu rețin absorbția preparatului. Intervalul între administrarea Panangin-ului și acestor preparate va constitui 3 ore. La administrarea preparatului cu diureticele economisitoare de potasiu sau inhibitorii enzimei de conversie poate să conducă la hiperkaliemie.

PREZENTARE, AMBALAJ

Câte 50 comprimate filmate în flacon din polipropilenă, închis cu căpăcel dotat cu sistem de control al primei deschideri.

Câte 1 flacon în cutie de carton.

Păstrare

A se păstra la temperatura 15-30°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Termen de valabilitate

5 ani. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Statutul legal

Fără prescripție medicală.

Data ultimei verificări a textului

August 2008

Denumirea și adresa producătorului

„Gedeon Richter”, Budapesta, Ungaria

Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj!