

**POSTINOR**  
**comprimate**

**Numărul certificatului de înregistrare  
în Republica Moldova nr. 13341 din 11.09.2008**

*Citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe administrarea preparatului!*

*Păstrați acest prospect, deoarece poate apărea necesitatea de a-l reciti.*

*Dacă apar întrebări suplimentare, consultați medicul curant.*

*Acest preparat este destinat personal pentru Dumneavoastră.*

*Nu propuneți preparatul altor persoane, chiar dacă simptomele bolii sunt similare cu ale Dumneavoastră, deoarece aceasta le poate dăuna sănătății.*

**Ce reprezintă preparatul Postinor și în ce cazuri se administrează?**

Comprimatele Postinor conțin substanța sintetică levonorgestrel, acțiunea căreia este asemănătoare hormonului corpului galben.

Substanțe auxiliare: siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, amidon de cartofi, talc, amidon de porumb, lactoză.

Comprimatul Postinor este contraceptiv de urgență, care poate preveni dezvoltarea sarcinii, în caz dacă este utilizat în limita de 72 ore după actul sexual, în timpul căruia nu au fost folosite alte metode anticoncepționale ori metodele folosite nu au fost sigure.

**În ce cazuri poate fi administrat preparatul Postinor și cât este de eficient?**

Comprimatul Postinor poate fi administrat în orice zi a ciclului menstrual.

Metoda contraceptivă de urgență poate fi folosită doar în cazuri extreme. Metoda contraceptivă de urgență nu preîntâmpină sarcina în toate cazurile. Comprimatele Postinor preîntâmpină sarcina în 85% cazuri. Cu cât mai mult timp trece după actul sexual până la administrarea comprimatului, cu atât mai puțin eficient este preparatul (în primele 24 ore –95%, de la 24 până la 48 ore – 85% și de la 48 până la 72 ore – 58%). Nu sunt date referitor la eficiența preparatului administrat după 72 ore.

Dacă nu sunteți sigură de timpul contactului sexual ori ați avut un contact sexual neprotejat cu mai mult de 72 ore în urmă, în acest caz fecundarea putea avea loc. În acest caz administrarea preparatului după al doilea act sexual nu va fi eficientă. Eficacitatea preparatului Postinor este mai joasă decât a anticoncepționalelor, predestinate folosirii permanente. Dacă aveți nevoie să recurgeți des la metodele anticoncepționale urgente, ar fi bine să Vă gândiți la folosirea anticoncepționalelor permanente.

**În ce cazuri nu se administrează preparatul Postinor?**

Preparatul nu se administrează în caz de hipersensibilitate la componentele preparatului.

**Atenționări și precauții**

Dacă, în pofida faptului că preparatul a fost administrat, fecundarea a avut loc, este necesar să ținem cont de posibilitatea apariției sarcinii extrauterine.

Este necesar de a aprecia raportul beneficiu/ risc în cazul afecțiunilor hepatice grave.

Prezența maladiilor, în care este dereglat procesul de absorbție în tractul gastro-intestinal (exemplu – boala Crohn), poate micșora eficacitatea terapiei.

Administrarea repetată a preparatului în același ciclu menstrual nu este recomandată, din cauza posibilității apariției dismenoreei.

După administrarea preparatului consultați medicul referitor la metodele anticoncepționale posibile pe viitor.

Administrarea concomitentă cu unele preparate (antiepileptice, antimicotice, unele antibiotice) poate influența viteza de scindare a principiului activ și poate reduce efectul preparatului. Aceeași acțiune o au unele preparate fitochimice, ce conțin sunătoare (*Hypericum perforatum*).

Din aceste motive, Vă rugăm să informați medicul ori farmacistul despre preparatele folosite cu prescripție medicală ori procurate fără rețetă.

*În caz de sarcină*

Administrarea comprimatelor Postinor nu se recomandă în sarcină, preparatul nu întrerupe sarcina existentă. În caz de sarcină survenită pe fonul administrării Postinorului, conform datelor cercetărilor epidemiologice, nu a fost depistată acțiunea negativă asupra fătului.

#### *Alăptare*

În caz că alimentați la sân, consultați medicul până la administrarea preparatului.

#### **Cum se modifică ciclul menstrual după administrarea preparatului Postinor?**

După terapie, menstruația apare la timpul așteptat și decurge obișnuit. Rar se observă menstruație precoce ori tardivă. Dacă menstruația întârzie cu mai mult de 5 zile ori apare la timp dar decurge neobișnuit, ori se suspectă sarcina (prezența grețurilor, vărsăturilor, tensiune în glandele mamare ș.a.), adresați-vă la medic.

#### **Cum se administrează comprimatele Postinor?**

Se administrează două comprimate. Primul comprimat se administrează în limitele a 72 ore după actul sexual, însă pentru atingerea unui efect maximal administrarea trebuie să fie cât mai curând posibilă. (Vezi: În ce cazuri poate fi administrat preparatul Postinor și cât este de eficient?). Al doilea comprimat se administrează după 12 ore (dar nu mai mult de 16 ore) după administrarea primului comprimat.

Dacă după administrarea oricărui comprimat timp de 3 ore s-a declanșat voma, se folosește alt comprimat.

După folosirea preparatului anticoncepțional de urgență, până la survenirea următoarei menstruații se recurge la alte metode de contracepție (de exemplu: condomul).

După administrarea comprimatului Postinor nu numai că nu este contraindicată folosirea anticoncepționalelor orale permanente dar folosirea lor chiar se recomandă.

Nu se recomandă folosirea comprimatelor Postinor la copii.

Preparatul Postinor se administrează cu prescripția medicului și în dozele și durata stabilită de către el.

În caz de supradozaj pot apărea grețuri, dismenoree. În aceste cazuri adresați-vă de urgență la medic.

#### **Ce efecte adverse pot apărea la administrarea preparatului Postinor și cum să procedăm în aceste cazuri?**

Ca și în cazul altor preparate administrarea Postinorului poate cauza efecte adverse.

Frecvența lor este următoarea:

- Mai mult de 10% cazuri, dureri în porțiunea inferioară a abdomenului, fatigabilitate, cefalee, vertij, senzație de tensiune în glandele mamare.
- De la 1 până la 10% vărsături, diaree.

#### **Care sunt condițiile de păstrare a preparatului Postinor?**

Se păstrează la temperatura 15-25°C.

Preparatul trebuie să fie folosit în conformitate cu termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.

**Preparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.**

#### **Producător:**

**Gedeon Richter, Budapesta, Ungaria**