

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCIUNI PENTRU ADMINISTRARE

PROSTERID
comprimate filmate

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: № 12441 din 25.12.2007**

PROSPECT PENTRU PACIENT

***Citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe administrarea preparatului!
Păstrați acest prospect, deoarece poate apărea necesitatea de a-l reciti.
Dacă apar întrebări suplimentare, consultați medicul curant sau farmacistul.
Acest preparat a fost prescris de medic pentru Dumneavoastră. Nu propuneți
preparatul altor persoane, chiar dacă simptomele bolii sunt similare cu ale
Dumneavoastră, deoarece aceasta poate dăuna sănătății lor.***

Sumarul prospectului:

1. În ce afecțiuni este indicat preparatul Prosterid și cum el acționează?
2. În ce cazuri este contraindicat preparatul Prosterid?
3. Cum se va administra preparatul Prosterid?
4. Ce reacții adverse pot apărea la administrarea preparatului Prosterid și ce trebuie de făcut la apariția lor?
5. Cum trebuie de păstrat preparatul Prosterid?

Ce substanțe active și auxiliare conține preparatul Prosterid?

Un comprimat filmat conține :

Substanță activă : Finasterid 5 mg

Substanțe auxiliare:

Nucleul - stearat de magneziu, amidon carboximetilat de sodiu (tip A), amidon, celuloză microcristalină, lactoză monohidrat (102,25 mg).

Filmul – dioxid de titan (ind. col. 77891, E 171), lactoză monohidrat (0,3809 mg), macrogol 6000, hidroxipropilceluloză, hipromeloză.

Producător:

GEDEON RICHTER

Budapesta

Ungaria

1. În ce afecțiuni este indicat preparatul Prosterid și cum el acționează?

Administrarea comprimatelor Prosterid duce la scăderea nivelului hormonului dihidrotestosteron în sine și micșorarea în volum a prostatei, ca rezultat are loc ameliorarea semnelor adenomei benigne a prostatei (dificultate la urinare, staza urinei).

2. În ce cazuri este contraindicat preparatul Prosterid?

Hipersensibilitate la componentele preparatului.

Preparatul este indicat exclusiv pentru tratamentul bărbaților!

A nu se indica la copii și femei!

Ce trebuie de știut înainte de a începe tratamentul?

Precauții și atenționări speciale:

Dacă substanța activă a preparatului nimereste pe diverse căi în organismul femeii însărcinate, ea poate cauza dereglări în dezvoltarea organelor sexuale masculine la fătul de sex masculin. În scopul preîntâmpinării dereglărilor de dezvoltare a fătului de sex masculin, femeile însărcinate și cele la care e posibilă apariția unei eventuale sarcini nu trebuie să atingă comprimatele rupte și trebuie să evite contactul cu secrețiile sexuale a bărbaților ce urmează tratament cu Prosterid, atît pe parcursul tratamentului cît și timp de 2 luni după terminarea curei de tratament.

1. Pe parcursul tratamentului trebuie de evitat apariția sarcinii folosind o metodă sigură de contracepție (contraceptive hormonale orale, condom).
2. Dacă partenera Dumneavoastră este însărcinată, poate surveni sarcina sau sarcina nu poate fi exclusă, trebuie să evite contactul cu secrețiile sexuale și la contactul sexual se va folosi condomul.

Din cauză că nu este cunoscut ce perioadă persistă finasteridul (substanța activă a preparatului) în secrețiile sexuale ale bărbatului, aceste măsuri de precauție trebuie respectate timp de 2 luni după terminarea curei de tratament cu Prosterid.

Dacă Dumneavoastră administrați alte remedii medicamentoase, e necesar să consultați medicul sau farmacistul privitor la administrarea preparatului.

Cum influențează preparatul capacitatea de a conduce mașini și/sau de a manevra utilaje tehnice?

Nu sînt date disponibile despre influența preparatului asupra capacității de a conduce mașini și/sau de a manevra utilaje tehnice.

3. Cum se va administra preparatul Prosterid?

Preparatul poate fi administrat numai cu prescripția medicului, în doza și timpul indicat de medic.

Dozare – un comprimat filmat Prosterid o dată pe zi.

Administrarea alimentelor nu influențează eficacitatea preparatului.

Pentru apariția efectului dorit se recomandă tratamentul pe parcursul a mai multor luni.

Ce faceți în cazul supradozării preparatului Prosterid?

Dacă ați administrat o doză mai mare decît cea prescrisă adresați-Vă de urgență la medic!

Dacă ați omis o administrare nu suplimentați doza preparatului la următoarea administrare, deoarece astfel nu veți ajusta doza omisă, dar apare riscul supradozării preparatului.

În caz de supradozare nu este necesară terapia specifică.

4. Ce reacții adverse pot apărea la administrarea preparatului Prosterid și ce trebuie de făcut la apariția lor?

Ca și în cazul altor preparate la administrarea comprimatelor Prosterid pot apărea reacții adverse.

Reacțiile adverse apărute ca rezultat al administrării preparatului sînt rare, de obicei ușor exprimate și reversibile.

Cel mai des întîlnite sînt: impotența, scăderea libidoului, scăderea cantității secrețiilor seminale. Pot fi întîlnite: mărirea și tensiune la nivelul glandelor mamare, rar semne de hipersensibilitate (edem labial, erupții cutanate).

În caz de apariție a efectelor adverse sau altor manifestări neobișnuite e necesar de întrerupt administrarea preparatului și de consultat medicul privitor la administrarea ulterioară a preparatului.

5. Cum trebuie de păstrat preparatul Prosterid?

A se păstra la temperatura între 15- 30°C, la loc ferit de lumină.

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

A se păstra la loc inaccesibil pentru copii!