

**Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**  
**PROSPECT PENTRU PACIENT**

**QUAMATEL mini**  
**comprimate filmate**

**Numărul certificatului de înregistrare  
în Republica Moldova: nr. 10575 din 21.07. 2006**

**În ce cazuri se administrează Quamatel mini?**

Preparatul se administrează pentru ameliorarea de scurtă durată a acuzelor, legate de aciditatea crescută a sucului gastric, pirozis, gastralgie.

Substanța activă a preparatului - famotidina, în doză 10 mg micșorează aciditatea sucului gastric.

Substanțele auxiliare: bioxid de siliciu coloidal hidrofil, magneziu stearat, povidon, carboximetilamilopectină de sodiu, talc, amidon, lactoză, oxid de fier (III), bioxid de titan, hidroxipropilceluloză, stearat de macrogol.

În stomac, în normă se produce acid, îndeosebi după folosirea alimentelor ori lichidelor. Dacă se produce acid în exces, poate apărea durere acută, și disconfort. Un comprimat micșorează pe lungă durată producerea excesului de acid, pirozismul și acuze legate de aceasta.

**Cum să prevenim apariția acuzelor?**

Nu vă culcați imediat după alimentare. În caz de obezitate este necesar să reduceți greutatea corporală. Dacă fumați, este necesar să lăsați fumatul ori să micșorați consumul țigărilor.

Evitați ori micșorați consumul de cafeină, ciocolată, grăsimi și alcool. Nu mâncați înainte de somn.

**În ce cazuri nu se administrează preparatul?**

Hipersensibilitate la famotidină ori la alte ingrediente ale preparatului.

În sarcină, perioada de alăptare, vârsta până la 16 ani (din cauza experienței clinice limitate).

**Înainte administrării preparatului, numai decît adresați-Vă medicului, dacă:**

- Nu cunoașteți cauza dispepsiei,
- Aveți dispepsie și ați pierdut din greutatea corporală (dacă nu ați dorit să slăbiți),
- Sunteți pacient de vârstă medie ori mai în vârstă și acuzele Dumneavoastră au apărut prima dată ori s-a schimbat caracterul simptomelor semnalate mai devreme,
- Aveți scaune sangvinolente (melenă),
- Aveți maladii asociate ori primiți alte preparate,
- Aveți afecțiuni ale rinichilor și ficatului,
- Aveți dereglări ale deglutiției, dureri permanente în abdomen, deoarece aceste acuze pot fi în cazul unor maladii mai grave, care necesită alt tratament.

**Cum să administrăm preparatul?**

Dacă este necesar - consultați medicul.

Adulților, pentru înlăturarea durerilor cauzate de hipersecreție gastrică, li se administrează un comprimat pe zi, care se ia cu apă.

Pentru micșorarea secreției excesive a sucului gastric, cauzat de ingerarea alimentelor, se ia un comprimat, care se va bea cu apă, cu o oră înaintea mesei.

Dacă acuzele sunt semnalate din nou, poate fi administrat încă un comprimat, dar doza nictemerală nu trebuie să depășească 2 comprimate. Fără prescripție medicală preparatul nu se administrează mai mult de două săptămâni, deoarece hipersecreția de durată poate fi un indiciu al altor maladii. În acest caz consultați medicul.

Dacă simptomele se întesesc ori persistă după de două săptămâni de tratament, consultați medicul!

Preparatul nu se administrează copiilor până la 16 ani (din cauza lipsei de experiență).

### **Care sunt efectele adverse, posibile la administrarea preparatului Quamatel mini?**

Rar poate fi semnalată febră, cefalee, vertij. Foarte rar se înregistrează xerostomie (uscăciune în gură), grețuri, vărsături, disconfort gastric, meteorism, constipație, diaree, inapetență, fatigabilitate, icter. Rar au fost semnalate eritrocitopenie, agravarea afecțiunilor hepatice prezente, dar în aceste cazuri nu este demonstrată legătura cu administrarea preparatului.

Ca și în cazul altor medicamente, pot fi semnalate reacții alergice. Apariția pruritului, erupțiilor cutanate, edemului feței, artralgiei, dispneii ori pierderii cunoștinței se datorează hipersensibilității la preparat. Dacă în timpul administrării preparatului au apărut efectele descrise mai sus ori alte efecte neobișnuite, contactați imediat medicul.

### **Cum să procedăm în caz de supradozare?**

Dacă întâmplător ați administrat mai mult decât doza recomandată, imediat adresați-Vă medicului.

### **Condiții de păstrare**

La temperatura 15-30°C, la loc ferit de lumină.

Preparatul trebuie să fie folosit în conformitate cu termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.

Preparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

Dacă aveți alte întrebări adresați-Vă medicului sau farmacistului.

### **Producător**

**Gedeon Richter, Budapesta, Ungaria**