

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

RETABOLIL fiole
RETABOLIL INJ.

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova nr. 13345 din 11.09.2008**

*Citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe administrarea preparatului!
Păstrați acest prospect, deoarece poate apărea necesitatea de a-l reciti.
Dacă apar întrebări suplimentare, consultați medicul curant.
Acest preparat este destinat personal pentru Dumneavoastră.
Nu propuneți preparatul altor persoane, chiar dacă simptomele bolii sunt similare cu ale
Dumneavoastră, deoarece aceasta le poate dăuna sănătății.*

COMPOZIȚIE

1 fiolă (1ml) conține 25 sau 50 mg decanoat de nandrolon în soluție uleioasă pentru injecții.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Retabolil prezintă un derivat sintetic al testosteronului cu acțiune anabolizantă prelungită. Stimulează procesul de sinteză a proteinelor, provoacă reținerea crescută de azot, calciu, sodiu, potasiu, cloruri și fosfați, ceea ce conduce la mărirea masei corporale, creșterea oaselor și reținerea apei în organism.

INDICAȚII

Fiecare caz care necesită un efect anabolizant pronunțat și de durată sau dacă utilizarea de alte preparate anabolizante a rămas fără răspuns. Se administrează în retinopatie diabetică, miodistrofia evolutivă, amiotrofia spinală (sindromul Werding-Hoffmann), cancerul mamar.

CONTRAINDICAȚII

Cancerul de prostată, cancerul mamar la bărbați. Sarcina precedată de masculinizarea fătului. Nefroza sau faza nefrotică în nefrită.

UTILIZARE TERAPEUTICĂ

Se administrează intramuscular.

Adulți:

Câte 25-100 mg la fiecare 3 sau 4 săptămâni. În insuficiența renală severă câte 50 mg pe zi sau peste o zi.

Copii:

De regulă, 0,4 mg/kg la fiecare 3 sau 4 săptămâni.

EFECTE ADVERSE

Efectele adverse survin în urma acțiunii androgenice și anabolizante. La administrarea dozelor crescute și în repetate rânduri la vârsta pubertară poate avea loc osificarea prematură și stoparea creșterii. La femei pot apărea simptome de virilizare, inhibiția funcției ovariene, dereglări ale ciclului menstrual, creșterea libido-ului. Probele funcționale hepatice pot deveni pozitive.

PRECAUȚII

La rece soluția poate deveni opalescentă.

În acest caz, înainte de utilizare fiola va fi încălzită până la dezolvarea completă a cristalelor.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

La temperatura camerei (15-25° C).

PREZENTARE

1 sau 100 fiole

GEDEON RICHTER BUDAPESTA - UNGARIA