

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
PROSPECT PENTRU PACIENT

Terbisil comprimate 250 mg

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr. 10577 din 21.07.2006**

**Înainte de a începe administrarea preparatului,
Vă rugăm, citiți cu atenție această informație.**

Ce prezintă preparatul Terbisil și pentru ce se utilizează?

COMPOZIȚIA PREPARATULUI

Substanța activă: terbinafin 250mg

Substanțe auxiliare: celuloză microcristalină (PH 101), celuloză microcristalină (PH 102), ultra-amilopectin, bioxid de siliciu coloidal hidrofil, hidroxipropilmetilceluloză, stearat de magneziu.

Preparatul **Terbisil** se utilizează în tratamentul afecțiunilor micotice ale pielii, a părții piloase a capului și unghiilor. Identificarea fungilor se va face printr-un examen de laborator preliminar.

În ce cazuri este contraindicată utilizarea preparatului Terbisil comprimate 250mg?

- în hipersensibilitate față de componentele preparatului;
- la copii cu masa corpului sub 40kg;
- în sarcină, în perioada de lactație;

Administrarea concomitentă a altor medicamente trebuie consultată cu medicul, deoarece aceasta poate influența acțiunea preparatului **Terbisil**. Informați medicul dacă aveți afecțiuni hepatice și renale.

Cum se administrează comprimatele Terbisil 250mg?

Comprimatele **Terbisil** 125mg se administrează conform recomandărilor medicului.

La adulți se indică un comprimat o dată în zi cu o cantitate suficientă de apă, fără a fi mestecată, indiferent de luarea meselor.

Durata curei de tratament se va determina de medic în dependență de caracterul și gravitatea maladiei. Întreruperea curei de tratament poate duce la recidive. Consultați medicul despre măsurile care trebuie întreprinse pentru profilaxia recidivelor (ex. dezinfectarea încălțăminte)

Ce e de făcut când ați uitat să administrați preparatul?

Comprimatele **Terbisil** trebuie administrate în fiecare zi la aceeași oră. Dacă ați uitat să luați comprimatele și pînă la următoarea administrare a rămas mai mult decît 4 ore o puteți administra, dacă a rămas mai puțin de 4ore – așteptați următoarea oră de administrare.

Ce efecte adverse nedorite pot avea comprimatele de Terbisil 250mg și ce măsuri trebuie întreprinse la apariția acestor efecte?

De obicei preparatul este bine tolerat. În unele cazuri se observă: greață, dureri epigastrice nepronunțate, diaree, inapetență (lipsa poftei de mîncare), reacții cutanate, pierderea senzațiilor gustative. Rar se pot observa: dureri musculare și articulare, alopecie. De obicei aceste efecte adverse sunt puțin pronunțate și dispar după terminarea tratamentului. Foarte rar pot avea loc reacții cutanate severe de tip sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermală, schimbări ale sistemului hematopoetic.

Atenționări și precauții speciale

În cazuri mai dese de greață, anorexie, astenie e necesar de consultat medicul. La apariția durerilor în gât cu temperaturi ridicate, în icterul sclerelor, pielii, în caz de întunecarea urinei și acolia maselor fecale tratamentul trebuie întrerupt. Despre aceste schimbări trebuie informat medicul.

Supradozaj

Sunt posibile cefalee, vertij, grețuri, dureri epigastrice. În caz de supradozare adresați-vă imediat medicului sau la cel mai apropiat staționar (spital).

Păstrare

La temperaturi între 15-30°C, la loc ferit de lumină. Preparatul poate fi folosit pînă la expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

A se păstra la loc inaccesibil copiilor!

Cu toate întrebările referitor la administrarea comprimatelor Terbisil 250mg, adresați-vă medicului sau farmacistului.