

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
**PROSPECT PENTRU PACIENT**

**Terbisil cremă 1%**

**Numărul certificatului de înregistrare  
în Republica Moldova: nr. 10578 din 21.07.2006**

**Înainte de a începe utilizarea preparatului,  
Vă rugăm, citiți cu atenție această informație.**

**Ce prezintă preparatul Terbisil cremă 1% și pentru ce se utilizează?**

**COMPOZIȚIA PREPARATULUI**

*Substanța activă:* terbinafin 0,15

*Substanțe auxiliare:* hidroxid de sodiu, alcool benzilic, sorbitan monostearat, cetil-palmitat, alcool cetilic, alcool cetil-stearilic, polisorbant-60, isopropil miristat, apă demineralizată.

Preparatul **Terbisil** cremă se utilizează în tratamentul topic al afecțiunilor micotice a pielii și unghiilor (în terapie combinată).

**În ce cazuri este contraindicată utilizarea preparatului Terbisil cremă 1%?**

- în hipersensibilitate față de componentele preparatului;

În caz de necesitate de a trata copii, femeile gravide și în perioada de alăptare e necesar de a consulta medicul.

**Cum se administrează Terbisil cremă 1%?**

Administrarea cremei **Terbisil** 1% și durata tratamentului se face la recomandarea medicului.

Crema se aplică pe pielea prelucrată și uscată 1-2 ori pe zi, într-un strat subțire, masînd ușor. În tratamentul porțiunilor cutanate submamare, interdegetale, în plicile fesiere și inghinale se recomandă aplicarea cremei sub pansament.

Durata cursului de tratament îndelungată a preparatului. Consultați medicul despre măsurile care trebuie întreprinse pentru profilaxia recidivelor (ex. dezinfectarea încălțămintei ) se va aprecia de medic în dependență de caracterul și gravitatea maladiei. Întreruperea cursului de tratament poate duce la recidive.

Dacă după 1-2 săptămîni de tratament nu se determină ameliorare, consultați medicul.

Pentru tratamentul afecțiunilor micotice ale unghiilor se recomandă utilizarea

**Atenționări și precauții speciale**

Terbisil cremă 1% se indică numai pentru uz extern. Se interzice aplicarea cremei pe mucoasa ochilor. Dacă, totuși aceasta s-a produs e necesară spălarea ochilor cu o cantitate mare de apă. În caz de necesitate adresați-vă medicului-oftalmolog. După fiecare aplicare a cremei e necesară spălarea mînilor!

**Ce efecte adverse nedorite poate avea crema Terbisil 1% și ce măsuri trebuie întreprinse la apariția acestor efecte?**

La utilizarea cremei pot apărea: hiperemia pielii, senzație de usturime și prurit. Aceste efecte, de regulă, sunt puțin pronunțate și dispar după terminarea tratamentului.

**Păstrare**

La temperaturi între 15-30°C, loc ferit de lumină. Preparatul poate fi folosit pînă la expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**A se păstra la loc inaccesibil copiilor!**

**Cu toate întrebările referitor la administrarea cremei Terbisil 1%,  
adresați-vă medicului sau farmacistului.**

