

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
PROSPECT PENTRU PACIENT

Vinpocetină comprimate 5mg

**Numărul certificatului de înregistrare
în Republica Moldova: nr.11264 din 09.02.2007**

Vinpocetina crește absorbția și utilizarea glucozei și O₂ de către țesuturile cerebrale, stimulează procesele metabolice. Crează toleranța la hipoxie: scindarea glucozei îndreaptă calea anaerobă în direcție energetic mai favorabilă, mărește nivelul cerebral de AMP-ciclic. Crește concentrația de ATP în creier, îmbunătățește corelația ATP – AMP; mărește circulația cerebrală a noradrenalinei și serotoninei; stimulează sistemul noradrenergic ascendent; exercită acțiune antioxidantă.

Îmbunătățește microcirculația în țesuturile cerebrale; inhibă agregarea trombocitelor, micșorează viscozitatea patologic crescută a sângelui, mărește deformarea eritrocitelor și inhibă absorbția adenozei de către ele; contribuie la transportul tisular de oxigen datorită micșorării legăturilor eritrocitelor cu oxigenul.

Selectiv mărește circulația intracerebrală; micșorează rezistența vaselor cerebrale fără a acționa asupra indicilor generali ai circulației sanguine.

1. **GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ și codul ATC**

Psihostimulant și nootrop N06B X18

2. **COMPOZIȚIA PREPARATULUI**

Substanța activă-vinpocetină 5mg

3. **INDICAȚII TERAPEUTICE**

Simptomele insuficienței cerebrale (tulburări ale memoriei, afazie, apraxie, afecțiuni motorii, vertij, cefalee e.t.c). Simptomele vegeto-vasculare ale sindromului climacteric.

În oftalmologie: afecțiunile retiniene vasculare de ordin aterosclerotic și vasospastic, procesele degenerative vasculare și retiniene sau ale maculei galbene, trombozele și emboliile arteriale și venoase, hiorietinită seroasă centrală, glaucomul secundar.

În ORL: hipoacuziile vasculare, iatrogene sau senile, sindromul Menière, nevrita cochleovestibulară, acufenele, vertijul de proveniență labirintică.

4. **CONTRAINDICAȚII**

Sarcina, lactația.

5. **DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Intern câte 15-30mg pe zi (1-2 comprimate de 3 ori), doza de întreținere în stări cronice-15mg pe zi (1 comprimat de 3 ori).

Comprimatele se administrează după luarea mesei.

6. **REAȚII ADVERSE**

Din partea sistemului cardio-vascular: scăderea tensiunii arteriale de scurtă durată, tahicardie, extrasistolie.

Din partea sistemul nervos central: dereglarea somnului, vertij, cefalee, oboseală. Toate aceste simptome pot fi și cele ale maladiei de bază.

Din partea tractului gastro-intestinal: pirozis, dureri epigastrice, greață. Reacții alergice cutanate.

7. **INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE**

Nu sunt cunoscute

8. **PREZENTARE, AMBALAJ**

50 comprimate

9. **PĂSTRARE**

La temperatura camerei (15-30⁰ C), loc ferit de lumină.

10. **DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI**

GEDEON RICHTER
Budapesta- Ungaria